



Peteșii hemoragice al extremității urechilor.



Peteșii hemoragice pe mucoasa nazală.



Splina mult mărită, friabilă de culoare roșie - negricioasă.



Virusul PPA rezistă în produsele din carne timp de 6 luni !

ATENȚIE!

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Cine cauzează pesta porcină africană?

Pesta porcină africană este cauzată de un virus, fiind foarte rezistent și stabil în mediu.

Cît de mult durează de la infectarea porcilor, până la apariția semnelor de boală?

5-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile, posibil chiar câteva săptămâni, în cazul infecțiilor naturale cu tulpini slab patogene.

Cum arată un porc bolnav de pesta porcină africană?

Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli, dar se poate observa:

- moarte după 3-4 zile, posibil chiar la 100% în efectiv;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42,0 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a virfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împieticire în mers înaintea morții;
- vomitări, diaree (cu sânge) și urdori la ochi;
- avorturi la orice vîrstă de gestație.

Cum se transmite virusul?

Prin contact direct între animale sănătoase și cele bolnave sau indirect, prin:

- hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când originea cărnii de porc nu este cunoscută;
- alți vectori infecțioși ca: vizitatori, comercianți, vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat boala;
- toate secrețiile, excrețiile, țesuturile provenite de la animalele infectate, bolnave și moarte, precum și animale care au supraviețuit
- Căpușe anterior infectate.

Pot oamenii să se infecteze cu acest virus?

Nu!

Ce animale sunt receptive la PPA ?



Mistreți.



Porcii domestici.

Acțiuni în cazul confirmării PPA



Restricții privind circulația porcilor și a cărnii în zona de carantină.



Dezinfecția încăperilor în care au fost ținuți porcii bolnavi.

Ce animale suferă de pesta porcină africană?

Sunt afectați doar porcii domestici și mistreții, indiferent de rasă, vîrstă și sex.

Există vaccinuri împotriva pestei porcine africane?

Nu există vaccinuri și tratament eficient pentru pesta porcină africană.

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de PPA?

- anunț imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, sau medicul veterinar oficial, sau Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, sau primarul satului;
- izolez imediat animalul bolnav, sau cadavrul de alte animale fără semne de boală și îl prezint medicului veterinar;
- mă oblig să nu arunc cadavrul animalului în locuri neamenajate.

Cum putem preveni pătrunderea virusul pestei porcine africane?

- respectarea strict a măsurilor de biosecuritate;
- nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțăminte și hainele cu care ați umblat pe stradă;
- nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc;
- nu scoateți scroafele/vierii din exploataje în scopul monei cu animale din altă exploataje;
- nu cumpărați porci din locuri necunoscute, fără a fi identificați și fără certificat sanitar veterinar
- creșteți porcii doar în spații îngărdite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini, porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
- Este interzisă creșterea suinelor la stane
- Este interzisă creșterea suinelor în fonduri de vanatoare, cantoane

RETINEȚI:
RAPORTAȚI ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ, MOARTE, CROTALIAȚI ANIMALELE !
 DSVSA CALARASI 0242 / 313676